



SRPV PICARDIE

GRANDES CULTURES

**AVERTISSEMENTS AGRICOLES®**

Ministère de l'Agriculture  
 Service Régional de la Protection des Végétaux  
 Allée de la Croix Rompue - 518, rue St Fuscien  
 80094 AMIENS CEDEX 3  
 Tél. 22 33 55 97  
 Fax 22 33 55 56

Imprimerie SRPV : Directeur Gérard B. MATHON ISSN 0757 6609 CPPAP 1823AD

Bulletin technique N°28  
du 16 novembre 1994

## CEREALES

## COLZA

- Pucerons : situation toujours calme.
- Dégâts localisés de limaces.
- Ravageurs : situation calme.

## CEREALES

Stade : 2 feuilles à 2ème talle.

### RAVAGEURS :

Pucerons : Situation au 15/11/94.

LIEU	CULTURE	STADE	% de pieds colonisés
Crèvecœur le G. (60)	ESC	début tallage	0
Crèvecœur le G.	BLE	2 F	0
Petit Serans	BLE	début tallage	23
La Villeterte	BLE	«	traité - 0
Le Valereux	BLE	«	Ailés - 7
Le Valereux	ESC	«	3
Bornel	BLE	3 F	Ailés - 3
Beines	BLE	2 F	0
Nampcel	BLE	2 F	0
Berlancourt	BLE	2 F	0
Ormoy le Davien	BLE	3 F	0
Grand Fresnoy	BLE	3 F	5
Bertangles (80)	BLE	3 F	4
Airaines	BLE	3 F	0
Airaines	ESC	3 F	0
Airaines	BLE	2 F	2
Oust Marest	ESC	1 talle	Traité 0
Oust Marest	BLE	3 F	5
Martaigneville	BLE	2-3 F	0
Ognes (02)	BLE	3 F	0
Le Haucourt	BLE	3 F	0
Fressencourt	ESC	4 F	0

### NOS CONSEILS :

- Pas d'intervention dans la plupart des cas.
- Les semis précoces (avant le 05 octobre) ont dû être traités en présence de pucerons.
- Pour des semis plus tardifs, intervenez au cas par cas si les colonies de pucerons commencent à s'installer (seuil de 10 % de pieds porteurs d'au moins un puceron).

### RAPPEL :

Pas d'intervention insecticide sur parcelles traitées GAUCHO au semis.

### Limaces :

Des dégâts de limaces localisés sont encore observés à la faveur des conditions météorologiques favorables, en sols motteux et pierreux. Des pontes sont également visibles.

### NOS CONSEILS :

Observez vos pièges (une poignée de granulés dissimulée sous une tuile) et intervenez si nécessaire (présence de cadavres). Attention, les granulés doivent être répartis régulièrement afin d'éviter l'ingestion par le gibier et les animaux domestiques.

### MALADIES :

Sur escourgeon comme sur blé, on observe fréquemment une présence de maladies (Oïdium, Rouille Brune, Rouille Naine, Helminthosporiose).

### NOS CONSEILS :

Un fongicide d'automne n'est jamais rentable. Ne pas traiter.



# COLZA

Stade : B5 à B8. Débuts d'élongation observés.

## ⌘ RAVAGEURS :

### Pucerons :

L'activité reste faible (moins de 10 % de pieds colonisés).

#### NOS CONSEILS :

*Il n'est plus utile de traiter.*

### Altises :

Quelques captures d'adultes en bacs jaunes, mais le risque est désormais nul.

#### NOS CONSEILS :

*Ne pas intervenir.*

### Charançon du bourgeon terminal :

Présence discrète.

#### NOS CONSEILS :

*Ne plus intervenir.*

### Mouche du chou :

Quelques attaques observées dans le secteur d'Airaines (80).

#### NOS CONSEILS :

*Aucun traitement foliaire en post-levée du colza n'est vraiment efficace.*

*Aucune intervention n'est donc justifiée.*

## ⌘ REGULATEURS DE CROISSANCE:

Se reporter au bulletin précédent.

### REMARQUE :

A cette date, des applications de régulateurs de croissance d'automne ne peuvent plus se justifier, même sur parcelles avancées.

## ⌘ MALADIES :

Quelques symptômes d'Oïdium ont été observés dans la Somme et dans l'Oise, en particulier sur semis dense.

#### NOS CONSEILS :

*Une intervention fongicide à l'automne reste non justifiée.*

WPS